

دليل الحقن

لدواء Bravelle® أو Menopur®

لقد وصف لك طبيبك دواء BRVELLE® أو MENOPUR® للحقن تحت الجلد. قبل الحقن، يتم استخدام نفس الأسلوب في إعداد BRVELLE® أو MENOPUR® باستخدام موائم قارورة الحقن Q·CAP® (الموضح في الصورة). سيساعدك دليل الإرشادات هذا في إعداد دوائك وحقنه في البيت. تناول دواءك دائماً طبقاً لإرشادات طبيبك تماماً.



استعدى

اغسلي يديك جيداً واجمعي الحاجيات اللازمة على سطح نظيف:



٢ انزعي الأغطية عن أمبولة حقن واحدة من كلوريد الصوديوم وعن كل أمبولة من دواء BRVELLE® أو MENOPUR® الذي وصفه لك الطبيب. امسحي الأجزاء العلوية من الأمبولات بقطعة من القطن الطبي المبلل بالكحول.



وعاء للتخلص من الإبر

MENOPUR® (أو) BRVELLE®

شاش طبي

كحول

Q·CAP®

سرنجة

كلوريد صوديوم

إبرة

قطن طبي مبلل بالكحول


املأى السرنجة بكلوريد الصوديوم



٦ اقلبي السرنجة (وهي متصلة بأمبولة الحقن) إلى أسفل. اجذبي دافع السرنجة للخلف لإدخال كمية كلوريد الصوديوم التي وصفها طبيبك إلى السرنجة. انزعي أمبولة كلوريد الصوديوم وتخلصي منها. الآن امسكي بأمبولة الحقن الأولى من BRVELLE® أو MENOPUR®.



٥ ادفعي الـ Q·CAP® لأسفل فوق أمبولة حقن كلوريد الصوديوم، لتتقبي القارورة. ثم اضغطي على دافع السرنجة لأسفل حتى النهاية لتنتقلي الهواء إلى أمبولة الحقن. استمري في الضغط على دافع السرنجة لأسفل حتى تتم الخطوة رقم ٦.



٤ اجذبي دافع السرنجة للخلف حتى العلامة السوداء (الخط الأسود) المناظر لكمية كلوريد الصوديوم التي وصفها لك طبيبك، عادة ما تكون ١ مللي لتر (اسم مكعب).



٣ إذا كانت هناك إبرة مغطاة فوق السرنجة، انزعها وضعها جانباً. لفي السرنجة داخل Q·CAP® (ناحية الموصّل).



١٤ كرري الخطوات الثلاث الأخيرة طبقاً لعدد أمبولات BRAVELLE® أو MENOPUR® التي أوصى بها طبيبك. عند الانتهاء، قد يكون لديك في السرنجة كمية من السائل أقل قليلاً مما كان فيها في البداية. هذا أمر طبيعي.

٩ اقلي السرنجة مع الأمبولة لأسفل، مع الضغط على دافع السرنجة لأسفل. اجذبي دافع السرنجة للخلف لنقل السائل بأكمله إلى السرنجة. انزعي الأمبولة وتخلصي منها.

٨ قلبِي برفق مع الضغط على دافع السرنجة إلى أسفل، حتى يصبح المحلول رائقاً. لا ترجِي.

٧ أثناء إمساكك بأمبولة دواء BRAVELLE® أو MENOPUR® بإحكام، اضغطي على Q-CAP®/السرنجة فوق الأمبولة حتى تنتقِب. اضغطي على دافع السرنجة لأسفل لنقل كل السائل إلى أمبولة الدواء.

أعدِّي الحقنة




١٤ اضغطي على دافع السرنجة ببطء حتى تتكون قطرة صغيرة على طرف الإبرة.

١٣ لتتخلص من أية فقاعات هواء، وجهي الإبرة إلى أعلى ثم اطرفي برفق على السرنجة حتى ترتفع كل الفقاعات إلى أعلى.

١٢ لفّي الإبرة المغطاء ثم انزعي الغطاء.

١١ لفّي Q-CAP® لفكته من السرنجة المملوءة.

احقني دوائك



١٨ تخلّصي من السرنجة في وعائك المخصص للتخلص من الإبر. تخلّصي من أية أمبولات مفتوحة ومواد حقن مستخدمة حيث أنه لا يمكن إعادة استخدامها.

١٧ حرّري الجلد واسحبي الإبرة للخارج برفق. إذا أدمى الموضع، اضغطي برفق باستخدام قطعة من الشاش الطبي. إذا تورّم، ضعي ثلجاً لفترة قصيرة.

١٦ امسكي بالجلد بقوة بين اصبعي يدي واحدة. امسكي بالجزء المستدير من السرنجة باليد الأخرى بزاوية ٩٠ درجة، ثم ادخلي الإبرة بسرعة في الجلد. اضغطي على دافع السرنجة حتى يحقن الدواء بأكمله.

١٥ اختاري موضع حقن على مسافة ١ بوصة على الأقل أسفل السرة على الجانب الأيسر أو الأيمن. (استخدمي جانباً مختلفاً كل يوم). نظفي الموضع بقطنة مبللة بالكحول واتركيه ليجف في الهواء.